



AGROMARINA ADRIANA C.A.


RIF: J-407965247



Cátalogo de Productos de Exportación congelados

Frozen Products Catalogo

 **adrianaseafood**



**Dirección: Calle. Tropical, Local galpón industrial,
Sector. Nuevo Pueblo Norte
Punto Fijo, Parroquia Norte, Municipio Carirubana,
Edo. Falcón - Venezuela**

**AGROMARINA ADRIANA**

T.F.A. 407965247

Pargo Rojo / Caribbean Red Snapper

(Lutjanus Purpureus)**DESCRIPCIÓN:**

Habita en el litoral en fondos de arena y piedras. **Vive entre los 20 y 40 metros de profundidad**, aunque puede llegar a los 250 metros. En invierno suele alejarse a aguas más profundas.

ORIGEN DEL PRODUCTO:**MAR CARIBE****ZONA DE CAPTURA:****FAO-31.****TEMPORADA:****TODO EL AÑO.****VOLUMEN DE PESCA:****5 Ton/mes.****VENTRESCA****ENTERO****LOMO****Caribbean Red Snapper/Lutjanus Purpureus**

Peso en recepción Peso en grs	Orden de proceso	Tallas del proceso		Empaque	
		Primario	Secundario	Primario	Secundario
200-240	005-Sin escamas, sin tripa, sin agallas	1/4-1/2 lb	84-227 grs	IWP	10 lb
241-330	005-Sin escamas, sin tripa, sin agallas	1/2-3/4 lb	205-303 grs	IWP	10 lb
331-480	005-Sin escamas, sin tripa, sin agallas	3/4-1 lb	304-454 grs	IWP	10 lb
481-700	005-Sin escamas, sin tripa, sin agallas	1-1 1/2 lb	455-605 grs	IWP	10 lb
701-1050	005-Sin escamas, sin tripa, sin agallas	1 1/2-2 lb	606-906 grs	IWP	10 lb
1050-1500	005-Sin escamas, sin tripa, sin agallas	2-3 lb	907-1362 grs	IWP	10 lb
1500-1900	Filet Pordon	3-4 Oz	84-227 grs	IWP	10 lb

Especificaciones del proceso Pargo Rojo / Caribbean Red Snapper / Lutjanus Purpureus

Peso en recepción Peso en grs	Orden de proceso	Tallas del proceso		Empaque	
		Primario	Secundario	Primario	Secundario
700-1500 grs	Filet Pordon	1/2-3/4 lb	205-303 grs	IWP	10 lb



AGROMARINA ADRIANA

T.F. 407965247

Cunaro / Beeliner Snapper

(*Rhomboplytes Aurorubens*)

Se encuentran en fondos semiduros de arena. Posee un cuerpo relativamente alargado, tiene color rojo con líneas amarillas oblicuas en el dorso. Su carne es blanca y de buen gusto.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

10 Ton/mes.



ENTERO



FILETE

Cunaro / Beeliner Snapper / *Rhomboplytes Aurorubens*

Peso en recepción Peso en grs	Orden de proceso	Tallas del proceso		Empaque	
		Primario	Secundario	Primario	Secundario
120-600 grs	Bufile (Mortiposa)	3-4 Oz	50-70 grs	1/P	8/lb
	Bufile (Mortiposa)	4-6 Oz	10-170 grs	1/P	8/lb
	Bufile (Mortiposa)	6-8 Oz	170-220 grs	1/P	8/lb
	Bufile (Mortiposa)	9-10 Oz	220-250 grs	1/P	8/lb

Tahali / Ribbon fish

(Trichiurus Lepturus)

Al Tahali se le conoce como machete o pez sable pertenece a la familia Trichiuridae (Teleostei), es un pez de actividad costera circuntropical capturada en aguas tibias templadas, con hábitos carnívoros y como especie pelágica se agrupa en cardúmenes cerca del fondo entre los 100 y 350 metros de profundidad alimentándose de peces, cangrejos y camarones.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

JUNIO-ENERO.

VOLUMEN DE PESCA:

10 Ton/mes.



ENTERO



LOMO

Tahali / Ribbon Fish / Trichiurus Lepturus

Peso en recepción "W" Peso en g/s	Orden de proceso	Tallas del proceso		Empaque	
				Primario	Secundario
300-500	Entero WR		300-500 g/s	WRP	10 kg
500-700	Entero WR		500-700 g/s	WRP	10 kg
700-1000	Entero WR		700-1000 g/s	WRP	10 kg
1000-1500	Entero WR		1000-1500 g/s	WRP	10 kg
1500-UP	Entero WR		1500-UP g/s	WRP	10 kg
400-700	MFT Block Interfilado		400-700 g/s		8 kg



AGROMARINA ADRIANA

T.F.A. 407965247

Guanapo / Lane Snapper (Lutjanus Sinagris)

Se encuentran en fondos arenosos limpios y también en áreas de aguas clara insulares. Posee una mancha negra o mayor que el obo debajo de la porción blanda de aleta dorsal, tangente o sobrepasando apenas la línea lateral. Su carne es blanca y de buen gusto para diferentes preparaciones.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO

VOLUMEN DE PESCA:

10 Ton/mes.



ENTERO



LOMO

Especificaciones del proceso Guanapo / Lane Snapper / Lutjanus Sinagris

Peso en recepción Peso en g/s	Orden de proceso	Tallas del proceso		Empaque	
				Primario	Secundario
100-240	003 - Sin escamas, sin tribo, sin agallas	1/4-1/2 lb	74-227 g/s	1/4 lb	10 lb
241-330	003 - Sin escamas, sin tribo, sin agallas	1/2-3/4 lb	228-333 g/s	1/4 lb	10 lb
331-400	003 - Sin escamas, sin tribo, sin agallas	3/4 - 1 lb	334-454 g/s	1/4 lb	10 lb
400 UP	003 - Sin escamas, sin tribo, sin agallas	1 - 1.5 lb	455-681 g/s	1/4 lb	10 lb
480 UP	003 - Sin escamas, sin tribo, sin agallas	1.5-2 lb	682-908 g/s	1/4 lb	10 lb
480 UP	003 - Sin escamas, sin tribo, sin agallas	2-3 lb	909-1362 g/s	1/4 lb	10 lb



AGROMARINA ADRIANA

P.F.A. 407965247

Roncador / Yellow Croaker

(Micropinias)

DESCRIPCIÓN:

Se encuentran en fondos arenosos limpios y también en áreas de aguas claras insulares. Posee

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

25 Ton/mes.



ENTERO

Especificaciones del proceso Roncador / Yellow Croaker / Micropinias

Peso en recepción	Orden de proceso	Tallas del proceso		Empaque	
		Primario	Secundario	Primario	Secundario
Peso en grs					
300-454	Pan Ready-HGT	5-8 Oz	145-232 grs	IQF	25 lb
455-906	Pan Ready-HGT	9-16 Oz	233-464 grs	IQF	25 lb
907 LP	Pan Ready-HGT	16-34 Oz	465-896 grs	IQF	25 lb



AGROMARINA ADRIANA

T.F. 407965247

Pargo Cebadal / Mutton Snapper

(*Lutjanus Analis*)



DESCRIPCIÓN:

Son peces comunes en zonas rocosas o corales, se alimentan de crustáceos, moluscos y peces. Tiene dos líneas azules en la mejilla, dientes caninos relativamente pequeños. Son de carne blanca y de buen gusto para diferentes preparaciones

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

2 Ton/mes.



ENTERO



FILETE

Pargo Cebadal / Mutton Snapper (*Lutjanus Analis*)

Peso en recepción "A"	Orden de proceso	Tallas del proceso		Empaque	
				Primario	Secundario
Peso en grs					
1500-2500	Entero sin tripa, sin agallas, con escamas y CO	2.5 lb	1690-2270 grs	IQF	44 lb
2551-3300	Entero sin tripa, sin agallas, con escamas y CO	5.7 lb	2271-3174 grs	IQF	66 lb
3301-4300	Entero sin tripa, sin agallas, con escamas y CO	7.9 lb	3175-4900 grs	IQF	66 lb
4301-7500	Entero sin tripa, sin agallas, con escamas y CO	9.15 lb	4001-6800 grs	WQF	66 lb



AGROMARINA ADRIANA

P.F.A. 407965247

Dormilona / obotes Surinamensi

(Sleepyhead)

Es un pez de la familia Lobotidae que habita por lo general en las zonas sombrias, y bajo plataformas de sargazos, muelles y otros. Se distribuye Ocasional en Florida, Bahamas, Caribe; también norte hasta Massachusetts, Bermudas, Golfo de México y sur hasta Argentina

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

JUNIO-JULIO.

VOLUMEN DE PESCA:

50 Ton/mes.



ENTERO



LOMO

Especificaciones del proceso Dormilona / Lobotes Surinamensis / Sleepyhead

Peso en recepción	Orden de proceso	Tallas del proceso		Empaque	
				Primario	Secundario
1000-1200	Filet	1/4-1/2 lb	114-227 grs	1WP	10 lb
2000-3000	Filet	1/2-3/4 lb	228-303 grs	1WP	10 lb



AGROMARINA ADRIANA

T.F. 407965247

Macabi / Bonefish

(*Albula Vulpes*)

Es una especie de la única familia, Albulidae, del orden Albuliformes. Es anfidromo, vive en aguas tropicales próximas a la costa, se mueve para alimentarse con la subida de la marea y se retira a aguas más profundas cuando la marea baja. Los juveniles pueden formar grandes cardúmenes de individuos de tamaño similar mientras que los individuos más maduros nadan en pequeños grupos o parejas.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

3 Ton/mes.



ENTERO



PULPA

Especificaciones del proceso Macabi / Bonefish / Albula vulpes

Peso en recepción	Orden de proceso	Tallas del proceso		Empaque	
				Primario	Secundario
Peso en grs					
500-999	HCT interfoliado	3/4-1lb	340-454 grs	BLOCK	25 lb
600-1600	HCT interfoliado	1-2 lb	290-906 grs	BLOCK	25 lb
1601-3200	HCT interfoliado	2-4 lb	909-1816 grs	BLOCK	25 lb



AGROMARINA ADRIANA

C.F.A. 407965247



Corvina Amarilla

Yellow Weakfish

(Cynoscion Maracaiboensis)

Es un pescado de agua salada que se encuentra en zonas costeras. Procedente de Venezuela, esta especie presenta una textura suave con un amarillos iridiscente y característico de la especie. Se comercializa entero sin espinas envasado al vacío en IVP a partir de pescado fresco en corte HGT o WCGs para ser empaquetado.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

5 Ton/mes.



ENTERO



FILLET

Especificaciones del proceso de Corvina Amarilla / Cynoscion Ocoupa / Cynoscion Maracaiboensis

Peso en recepción	Orden de proceso	Tallas del proceso		Empaque	
		Primario	Secundario	Primario	Secundario
Peso en grs					
320-500	Fillet sin espinas con piel y CD	2-4 Oz	116-692 grs	IVP	10 lb
500-700	Fillet sin espinas con piel y CD	4-6 Oz	714-716 grs	IVP	10 lb
700-900	Fillet sin espinas con piel y CD	6-8 Oz	714-1332 grs	IVP	10 lb
900-1199	Fillet sin espinas con piel y CD	8-10 Oz	253-2816 grs	IVP	10 lb
1200-1499	Fillet sin espinas con piel y CD	10-12 Oz	290-348 grs	IVP	10 lb
1500-2500	Fillet sin espinas con piel y CD	1-3 lb	454-1062 grs	IVP	30 lb
2551-6300	Fillet sin espinas con piel y CD	3-5 lb	1365-2270 grs	IVP	30 lb



**Pojo / Lamparosa /
*Selene vomer***



El pez luna o jorobado, *Selene vomer*, es un teleósteo representante de la familia Carangidae con distribución en las costas del Atlántico Occidental, caracterizado por el extremo aplanamiento lateral de su cuerpo.

Hábitat:

Marino, demersal, en fondos duros y arenosos someros.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

10 Ton/mes.



Especificaciones del proceso: Entero con vísceras

Tallas: 200 – 800 grs

800 – grs-UP



AGROMARINA ADRIANA C.A.

RIF: 3-407965247



**koebie /Corvinata blanca/
*Plagioscion squamosissimus***



Posee varios representantes en agua dulce: el género *Plagioscion* es el más común. Peces de escamas, de color plata azulado, boca oblicua, con un gran número de dientes recurvados y puntiagudos.

Hábitat: distribuye en el malecón de barrancas del Orinoco Venezuela. En estuarios y aguas costeras, en la boca de los ríos.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

10 Ton/mes.



Especificaciones del proceso: Entero IWP-Pan Ready- rodajas

Tallas: 500 – 1000 grs

1000 – 2000 grs

150-200 grs Rodajas



AGROMARINA ADRIANA C.A.

RIF: 3-407965247



plat plat/ Paguara

Chaetodipterus faber



Se trata de un pez plateado, con cuatro o seis bandas verticales en cada flanco de color oscuro. El cuerpo está fuertemente comprimido y las aletas dorsales están claramente separadas. Los radios de la segunda dorsal y los de la anal son muy largos.

Habitat: en ensenadas con fondos arenosos o de escombros y arrecifes; frecuentemente en grandes cardúmenes de cientos de adultos.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

08 Ton/mes.



Especificaciones del proceso: Entera con Visceras
Tallas: 200 grs -UP



AGROMARINA ADRIANA C.A.

RIF: 3-407965247



**Moonfish / Pámpano /
*Trachinotus falcatus***



También conocido como palometa "cometrapo" o palometa del Pacífico, es un pez marino de la familia de los estromateidos, distribuido por la costa americana del océano Pacífico.

Habitat: Pelágico en agua asturianas y marinas. Isla de margarita y NE de Venezuela hasta argentina, raro al norte del centro de Brasil.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

05 Ton/mes.



**Especificaciones del proceso: Entera con Visceras
Tallas: 100 – 500 grs**



AGROMARINA ADRIANA C.A.

RIF: 3-407965247



**Jarabakka /Bagre /
*Sciades parkeri***



Amarillo a gris o azul-gris arriba, blancuzco debajo.
Alcanza 190 cm. En estuarios y aguas costeras, en la boca de los ríos. Rango de profundidad: 1-20 m.
Hábitat: Se encuentra entre los ríos costeros entre Guayana y Brasil.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

05 Ton/mes.



Especificaciones del proceso: Rodajas



AGROMARINA ADRIANA C.A.

RIF: 3-407965247

Koepila /bagre / *Sciades proops*

Gris a marrón oscuro o azul oscuro arriba, blancuzco debajo. Alcanza 100 cm. Principalmente en aguas salobres de estuarios y lagunas, también en agua dulce y lagunas hipersalinas. Rango de profundidad: 1-20 m

Habitat:

En ríos y estuarios turbios, hasta aguas hipersalinas. Rango de profundidad de 1-20 metros. En el golfo de paria (Venezuela) hasta la boca del amazonas.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

10 Ton/mes.



Especificaciones del proceso: Trozos, rodajas y filet



AGROMARINA ADRIANA C.A.

RIF: 3-407965247



Bonga / Chicharro /
Chloroscombrus chrysurus



Mitad superior del cuerpo verde azulado, costados y abdomen plateados; con una mancha negra en el opérculo; margen de la aleta dorsal y del lóbulo superior de la caudal, negro; los juveniles tienen 4-5 barras negras en los flancos. Talla: alcanza 50 cm.

Habitat:

Pelágico, forma cardúmenes en aguas costeras; los juveniles y estuarios y lagunas de manglares. Profundidad de 0 a 110 metros. En ambos lados del atlántico, de Massachusetts hasta Uruguay.

ORIGEN DEL PRODUCTO:

MAR CARIBE

ZONA DE CAPTURA:

FAO-31.

TEMPORADA:

TODO EL AÑO.

VOLUMEN DE PESCA:

20 Ton/mes.



Especificaciones del proceso: Entera con vísceras